

# RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I TESTOVA ZA PROCJENU EKSPLOZIVNE SNAGE KOD MLADIH RUKOMETĀŠA

Miroslav Živković<sup>1</sup>, Slobodan Goranović<sup>2</sup>, Saša Marković<sup>3</sup> i Nataša Branković<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, BiH

<sup>2</sup>Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka, BiH

<sup>3</sup>Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija

DOI: 10.5550/sgia.1001036

COBISS.BH-ID 1844760

Orginalni naučni članak

UDK: 796.3:572.7

## SUMMARY

The authors have carried out this research on a sample of 50 young handball students, beginners at the school of handball in Niš, aged 11 and 12. The aim of the research was to determine the canonical relations of morphological characteristics on the one hand, and tests for the evaluation of explosive strength on the other, among young handball players. The subject matter of the research was to study the extent of the influence of morphological characteristics on the achieved results of explosive strength. Ten anthropometric measures for morphological characteristics which define the longitudinal and transversal dimensionality of the skeleton and circular dimensionality and body mass. Explosive strength was evaluated by means of three tests. The results of the correlational analysis have shown that a significant canonical factor as well as a high correlation exist between morphological dimensions (as the predictor system) and explosive strength (as criterion system).

**Key words:** young handball players, morphological characteristics, explosive strength.

## UVOD

Morfološki prostor sa aspekta dimenzionalnosti utvrđuje se antropometrijskom tehnikom mjerjenja. Faktorskom analizom manifestnih varijabli istraživači su prodrli u strukture morfoloških i drugih dimenzija psihosomatskog statusa čovje-ka i tako otkrili latentne dimenzije, koje su odgovorne za spoljne manifestacije određenih pojava. Morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti međusobno su usko povezane i značajno utiču na realizaciju motoričkih zadataka u rukometu. Preko morfološke strukture manifestuju se motoričke sposobnosti pa se ova dva prostora prema većem broju istraživanja (Zaciorski 1975; Malackov, Željaskov 2004; Milanović 2007) tretiraju integralno i uporedo izučavaju.

Morfološke karakteristike su od posebnog značaja za orijentaciju i selekciju u većini sportskih disciplina, a to je vidljivo u jednačini specifikacije uspjeha u pojedinim sportskim igrama, pa i kod svake specifične pozicije-funkcije u ekipi, morfološke dimenzije zauzimaju jedan od najvažnijih položaja (Milanović, 1980; Hošek i Pavlin, 1983; Bala i Popmihajlov, 1988; Doder, 1998; Malacko i Fratrić, 2003). Za veliki broj sportskih disciplina uglavnom je već poznata morfološka struktura koja najviše utiče na sportsku efikasnost, mada se, nema sumnje, koeficijenti učešća pojedinih morfoloških dimenzija u jednačini specifikacije mjenaju u funkciji razvoja tehnike i taklike i savremenih svjetskih dostignuća u određenom sportu.

Donošenje Međunarodnog biološkog programa (International Biologicl Program - IBP) sredinom 60-ih godina prošlog vijeka označio je

veliki pomak, teorijski i metodološki u proučavanju čovjeka. U okviru te standardizacije donesen je i spomenuti propis IBP od 39 antropometrijskih mjeru koje se koriste u antropometrijskim istraživanjima kao i metodologija mjerena.

Morfološke karakteristike značajno doprinose uspjehu rukometaša u igri. Kako se ispred gola najčešće postavlja „zona“ sastavljena od protivničkih igrača, može se predpostaviti da će više uspjeha imati onaj igrač koji nakon odskoka uvise za šut na gol svojim gornjim ekstremitetima nadvisi „zonu“, odnosno onaj koji ima i veću visinu tijela (Kovač i sar, 1982; Pokrajac, 1983; Đurašković, 2000; Duraković, 2008; Pivač, 1999; Gardašević, 1999; Goranović i sar, 1999, 2002, 2003, 2009). Ove i druge specifičnosti ukazuju da su za rukomet važne informacije o morfološkim karakteristikama igrača, a posebno kod rukometaša kod kojih još nije završen proces rasta i razvoja (Pivač i Stanković, 1991).

U dosadašnjim istraživanjima je konstatovano da je utvrđivanje zakonitosti transformacionih procesa u sportu vrlo zahtjevan zadatok (Roberts i Treasure, 1992; Adams i Brynteson, 1993). Sama činjenica da je ljudski organizam izuzetno složen i kompleksan sa puno međusobno ovisnih funkcija, gdje se djelovanjem na jedan segment utiče na čitav niz drugih organskih sistema i segmenata (Mraković, 1992). Ta povezanost je posebno naglašena kada se želi postići optimalan razvoj uz postizanje vrhunskih sportskih rezultata (Malina, 1986) i zbog toga se uz poznavanje i primjenu praktičnih i specijalističkih znanja teži usmjeravanju u što ranijem uzrastu (Ismail i Cowel, 1961; Malina, 1984; Shepard i Zavallee, 1994; Payne i sar, 1997).

Rezultati ovog rada imaju svoju vrijednost u mogućnosti njihove primjene u praksi. Na osnovu relacija između morfoloških karakteristika i eksplozivne snage mogu se utvrditi kriterijumi primjenljivi pri orientaciji, odnosno selekciji mladih rukometaša.

Predmet rada je utvrđivanje nivoa analiziranih morfoloških karakteristika i eksplozivne snage polaznika rukometne škole u Nišu, uzrasta 11 i 12 godina.

Osnovni cilj ovog istraživanja je da se utvrde relacije između morfoloških karakteristika sa jedne strane i rezultata eksplozivne snage sa druge

strane, kao latentne dimenzije motoričkog prostora, polaznika rukometne škole u Nišu.

## METODE

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 50 mladih rukometaša, učenika osnovnih škola u Nišu, polaznika rukometne škole, uzrasta 11 i 12 godina. Da bi mogli ući u uzorak, ispitanici su morali da zadovolje neke ranije utvrđene kriterijume: da su najmanje jednu godinu obuhvaćeni trenažnim radom i da su učestvovali na svim mjerjenjima morfoloških karakteristika i eksplozivne snage.

Uzimanje podataka mjerjenjem antropometrijskih varijabli vršilo se po metodu IBP - Internacionalnog biološkog programa (Lohman, Rocke & Martorell, 1988), uz primjenu optimálnih uslova mjerjenja (prije podne od 7-14 časova, instrumenti standarde izrade, dvorana optimalno prostrana i osvjetljena sa temperaturom od 17 do 22°, sa 5 obučenih mjerilaca, a na svakom ispitaniku su dermografskom olovkom određene i obilježene relevantne tačke i nivoi, koji su bili obuhvaćeni ovim mjerjenjem).

Za potrebe ovog rada analizirano je 10 antropometrijskih mjer morfoloških karakteristika koje definišu longitudinalnu dimenzionalnost skeleta: visina tijela (AVIS), dužina ruke (ADUR), dužina noge (ADUN); transferzalnu dimenzionalnost skeleta: širina ramena (AŠRA), širina karlice (AŠKA), širina kukova (AŠKU); i cirkularnu dimenzionalnost i masu tijela: obim nadlaktice (AONL), obim grudnog koša (AOGR), obim nadkoljenice (AONK), masa tijela (AMAS). Primjenjena su tri testa za procjenu eksplozivne snage: eksplozivna snaga tipa skočnosti - 2 testa: skok udalj iz mjesta (MSDM), skok uvise iz mjesta - Sardžent (MSVIS); i eksplozivna snaga tipa bacanja – 1 test: bacanje medicinke jednom rukom u dalj stoeći (MBMR).

Za obradu podataka korišćena je kanonička korelaciona analiza izračunata u statističkom paketu Statistica 7.0.

## REZULTATI

U proceduri utvrđivanja statistički značajnih relacija, odnosno dobijanja maksimalne povezanosti između sistema analiziranih antropometrijskih varijabli i testova za procjenu eksplozivne

snage, primjenjena je kanonička korelaciona analiza.

Rezultati kanoničke korelace analize pokazuju (Tabela 1) da je u relacijama između sistema prediktora, koje čine antropometrijske mjerne za procjenu morfoloških karakteristika i kriterijuma, koje čine varijable za procjenu eksplozivne snage, dobijen jedan statistički značajan kanonički faktor (Can R) koji sa 82% ukazuje na veličinu koeficijenta korelacije, što potvrđuje i procenat zajedničke varijanse koeficijenta deter-minacije (Can R2) za oba skupa varijabli sa 67%.

**TABELA 1.**

Kanonička korelaciona analiza morfoloških karakteristika i eksplozivne snage.

	Can R	Can R <sup>2</sup>	Chi-sqr.	p
0	.82	.67	73.40	.000

S obzirom na veličinu koeficijenta kanoničke korelacije (Can R) i procenta zajedničke varijanse (Can R2), može se izvesti zaključak da će se eksplozivna snaga mladih rukometara manifestovati u velikoj mjeri u zavisnosti od njihovog morfološkog prostora. Kanonički korjen je statistički značajan na nivou  $P=.000$ .

**TABELA 2.**

Kanonički faktori antropometrijskih mjera.

VAR.	Root 1
AVIS	.60
ADUR	.57
ADUN	.54
AŠRA	.47
AŠKA	.40
AŠKU	.52
AONL	.77
AOGR	.73
AONK	.72
AMAS	.78

Na Tabeli 2 prikazan je kanonički faktori antropometrijskih mjera, pa se može zaključiti da antropometrijske mjerne cirkularne dimenzionalnosti i mase tijela imaju najviše projekcije na kanonički faktor, pa prema tome i najviše uslovjavaju rezultate u svim testovima eksplozine snage (supresivan kao što se vidi iz rezultata

Tabela 4). Nešto manji, ali znatan uticaj na manifestacije eksplozivne snage imaju mjerne longitudinalne i transferalne dimenzionalnosti skeleta (pozitivan uticaj na manifestaciju eksplozivne snage - rezultati Tabela 4).

**TABELA 3.**

Kanonički faktori varijabli eksplozivne snage.

Varijable	Root 1
MSDM	.56
MSVIS	-.57
MBMR	.78

Na Tabeli 3 dobijeni rezultati ukazuju na velike projekcije testova eksplozivne snage na kanoniči faktori. Izrazito je velika projekcija vrijednosti testa bacanje medicinke rukom udalj stoeći (MBMR) na kanonički faktor, verovatno je proistekla na osnovu nekih strukturalnih, anatomske i biomehaničkih zakonitosti, jer su strukture izvođenja zadatka slične, s obzirom da se medicinka i rukometna lopta bacaju primarno aktivnošću gornjih ekstremiteta, uz sekundarno učešće ostalih dijelova tijela.

**TABELA 4.**

Kroskorelaciona analiza antropometrijskih mjera morfoloških karakteristika i testova eksplozivne snage.

	MSDM	MSVIS	MBMR
AVIS	.56	.44	.73
ADUR	.49	.52	.63
ADUN	.64	.51	.63
AŠRA	.62	.50	.57
AŠKA	-.53	-.44	.60
AŠKU	-.57	.52	.70
AONL	-.54	-.50	.78
AOGR	-.41	-.50	.80
AONK	-.60	-.66	.86
AMAS	-.52	-.65	.76

Iz matrice kroskorelacija antropometrijskih mjera morfoloških karakteristika i varijabli uspješnosti u testovima eksplozivne snage (Tabela 4), kod ispitanika, može se uočiti visok nivo koeficijenata korelacije. Najveću povezanost sa eksplozivnom snagom donjih ekstremiteta pokazuju antropometrijske mjerne longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (AVIS, ADUR, ADUN) i

po jedna mjera transferzalne dimenzionalnosti skeleta (AŠRA) kod oba testa (MSDM i MSVIS) i (ASKU) kod (MVIS). Preciznije rečeno najveću povezanost test eksplozivne snage skok u dalj iz mjesta – MSDM pokazuje sa (ADUN .64), (AŠRA .62), (AVIS .56), (ADUR .49). Sa ovim testom supresivan odnos pokazuju sve analizirane antropometrijske mjere cirkularne dimenzionalnosti skeleta, masa tijela i pojedine mjere transferzalne dimenzionalnosti skeleta: (AONK -.60), (AŠKU -.57), (AONL -.54), (AŠKA -.53), (AMAS -.52).

Sa testom eksplozivne snage skok u vis – MSVIS najveću povezanost imaju: (ADUR .52), (AŠKU .52), (ADUN .51), (AŠRA .50), (AVIS .44), a supresivan odnos sa ovim testom imaju: (AONK -.66), (AMAS -.65), (AONL -.50), (AOGR -.50).

Test eksplozivne snage bacanje medicinke rukom stojeći (MBMR) pokazuje najveću povezanost sa antropometrijskim mjerama cirkularne dimenzionalnosti i mase tijela: (AONK .86), (AOGR .80), (AONL .78), (AMAS .76), (AVIS .73), (AŠKU .70), a nešto manje sa longitudinalnom i transferzalnom dimenzionalnošću skeleta.

## DISKUSIJA

Rezultati istraživanja ukazuju da na rezultate motoričkih manifestacija eksplozivne snage utiču uglavnom sve antropometrijske mjere. Međutim, hijerarhijski najveći doprinos dale su antropometrijske mjere cirkularne dimenzionalnosti i mase tijela (supresivan kod eksplozivne snage donjih ekstremiteta: kod testa eksplozivne snage skok u dalj iz mjesta – MSDM i kod testa eksplozivne snage skok u vis – MSVIS, kao što se vidi iz rezultata - Tabela 4). Pozitivan uticaj na manifestaciju eksplozivne snage kod oba analizirana testa daju antropometrijske mjere longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (AVIS, ADUR, ADUN) i po jedna mjera transferzalne dimen-

zialnosti skeleta - AŠRA) kod oba testa (MSDM i MSVIS) i (ASKU) kod (MVIS).

Kod testa eksplozivne snage - bacanje medicinke rukom stojeći (MBMR), zapaža se da cirkularna dimenzionalnost i masa tijela: (AONK .86), (AOGR .80), (AONL .78), (AMAS .76), (AVIS .73), (AŠKU .70), pozitivno najviše doprinose manifestaciji eksplozivne snage gornjih ekstremiteta. Takođe pozitivno, ali nešto manje doptinos daju longitudinalna i transferzalna dimenzionalnost skeleta.

## ZAKLJUČAK

Utvrđivanje kanoničkih relacija između morfoloških karakteristika i testova eksplozivne snage, sprovedeno je na uzorku od 50 ispitanika, starih 11 i 12 godina, polaznika rukometne škole u Nišu. Prostor eksplozivne snage procjenjen je sa tri testa, dok su morfološke karakteristike procjenjene sa 10 antropometrijskih mjera.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da između antropometrijskih mjera morfoloških karakteristika, kao prediktorskog sistema, i rezultata eksplozivne snage, kao kriterijuma, postoji statistički značajna kanonička povezanost, na što ukazuju visoke proekcije morfoloških karakteristika i eksplozivne snage na kanonički faktor. Ovi rezultati mogu doprinjeti racionalizaciji trenaž-nog rada sa mladim rukometašima, tako što će se u trenažnom procesu posebna pažnja obratiti za razvoj onih morfoloških karakteristika koje najviše objašnjavaju postignute rezultate u analiziranoj eksplozivnoj snazi, a što će doprinjeti postizanju boljih sveukupnih sportskih rezultata. Takođe, dobijeni rezultati mogu dati doprinos u individualizaciji trenažnog rada, tako što će planiranje, programiranje, sprovođenje i kontrola trenažnog procesa biti prilagođena individualnim sposobnostima, osobinama i potrebama mladih rukometaća.

## LITERATURA:

- [1] Adams, T.M., & Brynteson, P.(1993). The effect of conceptually based physical programs on attitudes and exercise habits of college alumni after 2 to 11 years of follow-up. Research quarterly for exercise and sport, 64(2), 208-212.

- [2] Bompa, T. (1999). *Periodisation: Theory and methodology of training (Periodizacija: Teorija i metodologija treninga)*. Champaign IL: Human Kinetics
- [3] Goranović, S., Kahvić, J. i Kuzmanović, D. (2009). "Efekat specifičnog trenažnog modela rada na razvoj agilnosti kod mladih rukometara". Prvi međunarodni kongres – Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreativne, 3-4 juli 2009 godine, Banja Luka, Zbornik radova, str.143-148.
- [4] Hošek, A. i Pavlin, K. (1983). Povezanost između morfoloških dimenzija i efikasnosti u rukometu. *Kinezologija*, 15 (2), 145-151.
- [5] Ismail, A.H. & Cowel, C.C. (1961). Factor analysis of motor aptitude of preadolescent boys. *Research quarterly for exercise and sport*, 32, 505-513.
- [6] Kovač, J., Kovač, M., Jovanović, V. i Đurić, D. (1982). *Struktura takmičarske aktivnosti rukometara*. Novi Sad: OOUR Institut Fizičke kulture, FFK Univerziteta u Novom Sadu.
- [7] Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, D., i Viškić-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičku kulturu u Beogradu.
- [8] Malina, R.M. (1984). *Human growth, maturation and regular physical activity*. In: Boileau, R.A., ed *Advances in Pediatric Sports Sciences* (pp. 59-83), Champaign: Human Kinetics.
- [9] Malina, R.M. (1986). *Readiness for Competitive Youth Sport*. Champaign, IL: Human Kinetics Books.
- [10] Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž. i Oreb, G. (1989). *Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
- [11] Milnović, D. (1997). *Kinezološka dijagnostika bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti sportaša*. Zbornik radova – Dijagnostika treniranosti sportaša, 6. Zagrebački sajam sporta, str. 97-103.
- [12] Mraković, M. (1992). *Uvod u sistematsku kinezologiju*. Zagreb: FFK.
- [13] Payne, V.G., Morrow, J.R., Johnson, L. & Dalton, S.N. (1997). *Resistance training in children and youth: A meta-analysis*. *Research quarterly for exercise and sport*, 68(1), 80-88.
- [14] Pivač, M. i Stanković, D. (1991). *Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti rukometara*. 30 Kongres Antropološkog društva Jugoslavije, Ohrid.
- [15] Pokrajac, B. (1983). *Telesni i motorički status rukometara u odnosu na takmičarski nivo i komparativna analiza sa sportistima drugih sportskih igara*. Doktorska disertacija. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
- [16] Shepard, R.J. & Zavalle, H. (1994). *Changes of physical performance as indicator of the response to enhanced physical education*. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 34, 323-335.
- [17] Vučeta, D., Milanović, D. i sar. (2004). *Rukomet – Znanstvena istraživanja*. Zagreb: Kinezološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
- [18] Šentija, D., Matković, B.R, Vučeta, D., Tomljanović, M. i Džaja, I. (1997). *Funkcionalne sposobnosti vrhunskih rukometara i rukometarica*. Zbornik radova – Dijagnostika treniranosti sportaša, 6. Zagrebački sajam sporta, str. 36-43
- [19] Željkov, M. (2002). *Osnovi na sportnata trenirovka*. Sofija: GERA ART OOD.

Rad primljen: 17.06.2010. godine  
Rad odobren: 04.08.2010. godine

Adresa za korespondenciju:  
Prof. dr Slobodan Goranović,  
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta  
Bul. Vojvode Petra Bojovića 1A  
78 000 Banjaluka, BiH  
Tel. +387 65 94 49 15  
e-mail: sgoranov@teol.net